安定与美散痛……周龙祥译 3 12
氨苯喋啶与消炎痛……戴诗文译 3 13
噻嗪类药物副作用可能增加冠心病的危险性……步 威译 3 15
青霉胺与铁剂……张振家译 3 15
饮食纤维素与十二指肠溃疡病…周龙祥译 3 22
双氢克尿塞与消胆胺、降脂2号树脂……苏开仲译 3 31
新配方减少柳氮磺胺吡啶的副作用……黄金炜摘 3 39
短肠综合症病人降低氯头孢菌素的吸收……余国祥摘 3 46
氨茶碱与安定……苏开仲译 3 46
干扰素对中枢神经系统的毒性…苟奎斌摘 3 60
心得安与消胆安……戴诗文译 4 11
氯氮卓与抗酸剂……戴诗文译 4 26
大量服用抗酸药引起骨软化症和肌衰……李钖岩译 4 26
克服地高辛超量用药的途径……康 震译 4 36
丙硫氧嘧啶的肝毒性……李钖岩译 4 43
长期服用谷维素对高血脂症的效果……李 起译 4 46
大量使用羟乙基淀粉制剂对人体的影响……林一鸣译 4 64
补钾可以降低血压吗？……丛 江译 4 70
病人应用压力吸入器注意事项……邵宏华等译 4 75
庆大霉素与速尿……苏开仲译 4 79
奋乃静与双硫醒……苏开仲译 4 79
本刊1984年总目录……本刊编辑室 4 76
本刊征稿简则……本刊编辑室 4 封四
读者、作者、编者……本刊编者 1 封三
读者、作者、编者……本刊编者 2 封四
读者、作者、编者……本刊编者 3 封三
读者、作者、编者……本刊编者 4 封三

·文摘·

庆大霉素与速尿

据报道，应用速尿可伴随庆大霉素的血浆清除率明显降低。庆大霉素清除率的降低使其在血浆内有较高的浓度，在一次快速注射给药的一小时其浓度可升高达70%。因为庆大霉素血浆浓度高可出现耳中毒症状，故具有实际的重要意义。

最近进一步研究了速尿对庆大霉素清除率及其血浆浓度的影响，却得出完全不同的结论。在应用速尿后出现迅速利尿作用，且持续大约3小时之久。在此期间庆大霉素经尿排出约为其剂量的50%。单独应用庆大霉素时，同样时间经尿排出约为20%。在应用庆大霉素后7小时中呈现的效果相似，不过程度稍差。当与速尿合并给药时，庆大霉素剂量的64%排入尿中，但在同样时间内，单独应用庆大霉素时却有40%排泄。这个事实反映了速尿的利尿效能在应用后随着时间的推移而减弱。

评论：在实际情况中很难了解如何去解释这些相互冲突的报告。问题是这些实验结果不能答复庆大霉素与速尿合并用药是否适当。回答这一问题应持慎重态度，如果可能还是建议避免合并应用为佳，因为据报道在肾脏病损的情况下，庆大霉素与速尿合并治疗会加重肾毒性。

〔AJP《澳大利亚药学杂志》，64（755）：126，1983（英文）〕

苏开仲译 纪礼明校

奋乃静与双硫醒

本文报道了一例精神病患者应用奋乃静治疗（8 mg，2/日，血浆浓度2～3 nmol/L）使病情稳定，而本品与双硫醒并用时发生严重的相互作用。奋乃静的血浆浓度下降（在1 nmol/L以下），导致精神病症状复发。即使应用双倍剂量的奋乃静无论是对血浆浓度还是治疗效应均无改变。当双硫醒与奋乃静并用时，奋乃静的代谢产物磺氧化奋乃静的血浆浓度明显增加。

奋乃静庚酸酯（肌注）给药后，结果其血浆浓度升高，且症状得到控制。作者认为："似乎双硫静能激活肝酶，以致口服奋乃静后被转化成无活性的代谢物。非肠道给药可避免肝脏的首过效应，若奋乃静需要与双硫醒并用时，应考虑以非肠道途经给药"。

〔AJP《澳大利亚药学杂志》，64（761）：556，1983（英文）〕

苏开仲译 戴诗文校