

天,两臀部及骶尾部、骶部褥疮先后治愈。

讨论:“牛麝散”是依据病因辩证施治而筛选出来的药物,方中有牛黄、麝香具有清热解毒、活血通络消肿之功效;朱砂,珍珠具有定惊安神解毒生肌之功效;明矾以燥湿收敛有利于溃疡面愈合;冰片,新诺明具有抗菌消炎等作用。诸药混合使用,经长期临床观察,没有任何毒、副作用和过敏反应。因此促进局部血液循环旺盛,改善组织营养,镇痉止痛、解毒化瘀,促使组织新生与修复,有利于褥疮愈合。采用“复麝散”治疗褥疮局部外用,使药物直达病灶而且使用方

法简单,是治疗褥疮较理想的制剂。

小结:①该方剂采用中药和少量西药的复方制剂,具有协同作用,诸药物的来源丰富易得,便于配制。②诸药物的药理作用均无毒和副作用,使用安全可靠。③根据临床5年多的使用和观察,疗效较好,是目前治疗褥疮比较合理有效的复方制剂。

参 考 文 献

1. 医用药理学编写组,医用药理学,第二版,1982年,人民卫生出版社
2. 江苏新医学院,中药大辞典,1986年,上海科学技术出版社

· 文摘 ·

研究认为阿司匹林对怀孕有利

在荷兰的研究提供了许多证据,小剂量阿司匹林可以预防妊娠高血压和先兆子痫的病例。Henk Wallenburg教授和他的同事对一组孕妇预防使用阿司匹林进行评价,她们被判断有高血压和先兆子痫的危险。此组46个孕妇从孕期第28周至分娩期间内,分别给予小剂量阿司匹林(每天60mg)或安慰剂。结果服安慰剂组23个孕妇中,出现高血压、先兆子痫或子痫的病人共11个,而另组服阿司匹林的23个人中仅二人出现轻度高血压,此疗法对母亲和婴儿都没有副作用。

作者认为妊娠诱导的高血压和先兆子痫,据信与血小板和胎盘血栓素A的产生及最后造成血栓素A/前列腺环素的比例不平衡有关。

他们的理论认为,小剂量阿司匹林通过选择性地抑制血栓素A的生成,将使这种比例重新得到平衡。

一篇同时发表的主要文章认为,抗血小板药如阿司匹林用来预防或治疗先兆子痫是合乎逻辑的,但目前还没有定为常规疗法。《柳叶刀》杂志认为有必要进一步试验,此外阿司匹林导致新生儿出血的可能性也不能忽视。

[PJ《药学期刊》,236(6362),47,1986(英文)]

黎荫贤译 张紫洞校

青少年要慎用阿司匹林

自七十年代后期人们就证实了在一些病毒性疾病,如流感、水痘等发作期服用阿司匹林会并发雷耶氏综合征。该综合征是1963年在澳大利亚首次被发现的,它通常发生在流感、流行性腮腺炎、风疹、麻疹、脊髓灰质炎、疱疹等病毒性疾病的恢复期。常以疲劳、呕吐和严重精神和意识障碍为典型症状。雷耶氏综合征虽然不大常见,却严重危及人的生命。

过去由于儿科医生常给患儿服用阿司匹林,所以雷耶氏综合征患者大多是10岁以下儿童。自八十年代初以来,儿科医生开始用不含水杨酸盐的扑热息痛代替阿司匹林,所以儿童雷耶氏综合征的发病率明显下降。相反,青少年由于自己买药治疗并缺乏父母指导,现仍有不少人在患流感时服用阿司匹林,从而造成目前青少年雷耶氏综合征患病率的上升。流行病学专家Kuritsky等再次呼吁全社会要充分认识阿司匹林与雷耶氏综合征的关系。

目前阿司匹林的替代物一布洛芬正在逐渐地被普及。据有关专家说,这是一种比较安全的药物,至少到目前为止还没有任何迹象表明它与雷耶氏综合征有什么联系。

[《华盛顿邮报》1987年10月6日(英文)]

周辉节译