

胃复安所致的溢乳

李成建 柯银花

胃复安(灭吐灵)是治疗消化功能异常的常用药物,并广泛应用于多种原因引起的呕吐。常见的副作用为锥体外系反应。近年来国内文献报道,口服本品可引起溢乳,表现为双侧乳房发胀伴有轻微疼痛,乳头排出白色乳汁,常常自行流出;停用后泌乳亦逐渐停止,再次服用胃复安,二次出现类似现象。值得注意的是,这种现象也发生于青春发育期女性,且均为胃复安常规用量所致,停药后症状消失。据认为⁽¹⁻²⁾,胃复安所致溢乳现象可能与刺激催乳激素释放有关。胃复安系普鲁卡因胺衍生物,为脑内多巴

胺受体阻滞剂,当用胃复安致脑内多巴胺受体受到阻抑,多巴胺减少后,则泌乳激素释放因子增多而发生溢乳。此外也与个体因素有关。因此当使用胃复安后出现溢乳现象,应想到药物性溢乳的可能性。为了与其它原因所致溢乳进行鉴别,除了进行有关检查外,应停用可疑药物,并观察乳溢发展情况,不宜过早使用抑制垂体前叶催乳素分泌药物。

参 考 文 献

1. 邱子谦等: 前卫医药, 1986; (3): 64
2. 王素雅: 中级医刊, 1988; (5): 62

硝苯吡啶所致的心绞痛

李成建 张洪圣

硝苯吡啶(心痛定)为膜转移钙离子拮抗剂,被广泛用于治疗冠心病、心绞痛和高血压。近年来文献报道⁽¹⁻⁴⁾,本品可引起反常性心绞痛。有的用药后10~15分钟出现症状⁽²⁾,表现为窒息性疼痛;有的二次用药,再次出现⁽³⁻⁴⁾,停药后症状减轻。据认为硝苯吡啶在扩张冠动脉和增加冠状循环血量的同时,能反射性地引起交感神经兴奋性增强,加快窦性节律,增加心肌耗氧量,诱发心绞痛。此时,由于硝苯吡啶能降低血压和冠状动脉灌注压,导致冠状动脉内发生窃血现象,进一步加重心绞痛⁽³⁾。为避免此

类反应,要掌握好本品的适应证。因为服硝苯吡啶后心绞痛加重,有的发生在首次用药时,故应加强对心绞痛患者首次用药时的观察、监护,如有心绞痛加重应立即停药⁽⁵⁾。

参 考 文 献

1. Boden WE et al, JAMA, 1985; 253(8): 1131
2. Schanzenbacher P: Am J Cardiol, 1984; 53(2): 354
3. 马计湘等: 新药与临床, 1987; (6): 342
4. 赵以欣: 实用内科杂志, 1988; (1): 44
5. 俞洁贞: 同上, 1987; (7): 387