

少性紫癜无疑。吠喃唑酮可能抑制骨髓造血

功能,结合用量较小,属免疫性可能性大。

静脉滴注双黄连粉针剂致药疹二例

赵 虹 宋桂琴

(山东建筑医院 济南 250031)

双黄连粉针剂是纯中药材提取制成的无茵粉末。由双花,连翘,黄芩组成。具有抗多种细菌和病毒作用,我院门诊应用双黄连粉针剂(哈尔滨中药二厂生产,批号 940335)过程中出现 2 例药疹,现报告如下。

例 1,李××,男性,54 岁,因上呼吸道感染来院就诊。给双黄连 3600mg+5%葡萄糖氯化钠液(GNS)500ml,静滴,40 滴/min,qd,共 3d。第一天液体滴入 1h 后,患者感觉头晕、有轻微瘙痒感,滴完后,全身出现大小不等红色丘疹,高出皮肤,压之褪色,瘙痒加剧,口服扑尔敏和维生素 C。次日症状消失,再次静注双黄连粉针剂又出现红色丘疹,瘙痒感

症状,停用双黄连后,症状逐渐消失。

例 2,王×,女,47 岁,上呼吸道感染伴有肺部感染,来院就诊。给青霉素 G 钠 800 万 μ +5%GNS 250ml 静滴,qd,3d,肺干、湿罗音未完全消失,加用双黄连 3600mg+5%GNS 500ml,静滴,40 滴/min,qd,1h 后患者出现瘙痒,手臂麻疹样红斑伴有恶心、腹痛。患者难忍停止滴注,症状缓解,逐渐消失。

讨论:2 例患者在静脉滴注时,同时口服其他药物,停用双黄连粉针剂后,口服药物还继续服用,可排除口服药引起药疹,而静滴青霉素时!无此反应出现,故双黄连粉针剂所致药疹可以确定。

· 征订通知 ·

本刊自今年起正式更名为《药学实践杂志》,并从季刊改为双月刊,全年订价 26.40 元(含邮费)。欢迎各医院、医药院校、卫生单位、药检所、医药科研单位、药厂等图书馆、资料室及个人订购。欲订者可来信向本刊编辑部索取订单。本刊编辑部地址:上海国和路 101 号,联系人:顾文华。

本刊编辑部