

恶心、呕吐可采用氟哌啶醇 (Haloperidol) 对抗<sup>[2]</sup>。

曲马多是近年来世界上广泛使用的一种安全、有效、无成瘾性的中枢神经镇痛药物, 其为非麻醉类药物, 故无咖啡因副作用, 曲马多口服吸收快速、安全, 镇痛时间长达 6h, 其控释片每天只需服用两次, 无呼吸及心血管抑制作用, 耐药性极低, 对中、重度疼痛疗效显著。目前, 曲马多已被国内各大医院广泛用于临床, 在肿瘤患者的中、重度疼痛止痛方面屡建奇功。

路泰是由 90 年代最新控制释放技术制成, 能使药物的有效成分平稳释放, 以取得最佳疗效, 且能保持几小时有效地缓解疼痛, 被世界卫生组织推荐为缓解剧痛、癌痛的最佳药物, 近年来又被卫生部认定为癌症止痛药。

硫酸吗啡控释片 (美释康定), 盐酸吗啡控释片 (美非康) 也能有效控制疼痛达 12h 的口服强效镇痛药, 因服用方便, 是适合病人在家使用的癌症三阶梯止痛方案药物。

世界卫生组织癌痛治疗专家委员会要求患者有规律地“按时”用药, 而不是只在疼痛

时才用药。不要因为不痛就停药, 不要等到疼痛再现后才使用下一个剂量, 要维持体内恒定有效的血药浓度, 这对于做到让癌痛病人不痛十分重要。要尽可能口服给药, 口服途径与注射给药相比较不容易产生依赖性。避免创伤性给药途径, 便于长期用药。对于确实不能经口服给药的癌痛病人才考虑其它途径。尽可能做到个体化给药, 用药剂量不要千篇一律, 应以使患者达到有效镇痛为准来调整, 注意具体病人的实际疗效。对于慢性疼痛长期使用镇痛药物的病人, 耐受性是一个实际问题, 可通过以下方法解决: (1) 尽可能综合应用辅助药加强镇痛效果; (2) 交替使用不同类型的镇痛药而不要自始至终单用一种药物; (3) 疼痛减轻时, 药物剂量可逐渐调整, 用药间隔时间也可适当延长; (4) 配合其它止痛方法和给药途径。使镇痛药得以合理应用。

#### 参考文献

- [1] 聂鄂湘. 癌症病人使用麻醉药品情况的调查与分析. 中国药事, 1995; 9(1): 47
- [2] 梁苹. 肿瘤病人的心理障碍与药物治疗. 中国药房, 1994; 5(5): 44

## 胃复安引起精神病 1 例报告

张志彬

(解放军第 145 医院 山东莱阳 265200)

患者, 罗××, 男性, 48a, 慢性肾炎尿毒症终末期, 血透 2 次/wk, 一直平稳无反应。1996 年 5 月 20 日因吃阳桃后出现顽固性呃逆伴恶心呕吐。给予口服胃复安及肌注胃复安处理。24h 累计口服胃复安 20mg, 肌注 30mg 共计 50mg。次日晨出现骂人, 摔物, 不认识家属及主管医护人员, 经神经科会诊确定为精神病。给予多虑平 50mg, tid, po, 安定 10mg, im。于 1996 年 5 月 22 日晨恢复正

常。患者既往无精神病史, 也无家族史, 未服其他药物, 排除透析失衡综合征及尿毒症脑病, 考虑是胃复安过量引起。胃复安主要副作用是锥体外系作用, 引起肌震颤、共济失调、发音困难等, 诱发精神病发作实属罕见原因可能是此患者肾小球滤过率基本丧失, 短期大量运用引起胃复安蓄积中毒。提示我们对尿毒症患者用药一定要控制用量, 以免引起不必要的副反应而加重病人的痛苦。