

胞二磷胆碱致精神异常 1 例

刘安祥

(解放军第 289 医院 山西侯马 043014)

胞二磷胆碱为核苷衍生物,对改善脑组织代谢,促进大脑功能恢复和苏醒有一定作用。在临床应用较广。临床少见精神异常反应,现报告 1 例如下。

患者张××,女,51a。因患风心病、心房纤颤、右侧脑栓塞,于 1996 年 3 月 12 日住院。住院号:42050。当日首先静滴(第一组),复方丹参注射液 12ml 加低分子右旋糖酐 500ml,未见任何不适。后又继续静滴(第二组),胞二磷胆碱(江苏兴化制药厂,批号 95080312)0.5g,加 10% 葡萄糖 250ml。约 15min 左右,患者突然出现精神异常,处于兴奋状态,坐立不安,烦躁多语,哭闹无常,被害

妄想,人物定向障碍及视物不清,出现逆行性与顺行遗忘。精神科会诊排除精神病,嘱即停药。用安定 10mg、氯丙嗪 50mg, iv。约 20min 患者入睡,2h 后又烦躁不安,用 10% 水合氯醛 20ml 灌肠入睡,5h 后症状消失。考虑是复方丹参和低分子右旋糖酐所致,故停用此药。d2 用胞二磷胆碱 0.25g 加 10% 葡萄糖 250ml 静滴。10min 后上述症状再发,经对症治疗,3h 后症状消失。d3 停用胞二磷胆碱,继续用复方丹参加低分子右旋糖酐静滴,后又用青霉素钠加 10% 葡萄糖以及使用其它药物均未出现类似反应。故可认为本例是胞二磷胆碱引起的精神异常。

服泰胃美致过敏性哮喘 1 例

王清荣 刘菲

(东北电业中心医院 沈阳 110015)

患者男,43a,工人。于 1995 年 3 月 16 日入院,住院号 26094。病人既往健康,无过敏史。于入院前一天晚因胃区不适伴返酸而服用泰胃美 1 片(800mg)。次日晨起全身皮肤瘙痒,出现大片荨麻疹,同时胸闷、气短、干咳。于皮肤科就诊,经静注葡萄糖酸钙不见好转,且气喘加重而转内科。查体:四肢躯干见荨麻疹。端坐呼吸,双肺满布哮鸣音,未闻及湿罗音。心界不大,心律齐,心率 108 次/min,无杂音。胸片:双肺纹理增强。化验:WBC $7.4 \times 10^9/L$ 。给予吸 O₂,静滴氨茶碱,地塞米松及补液、对症治疗,住院 1wk 痊愈出院。出院后随访至今无哮喘发作。

讨论:泰胃美为组织胺 H₂ 受体拮抗剂,目前已广泛应用于消化性溃疡的治疗。其不良反应记载为少数患者有轻度、暂时性腹泻,眩晕,偶有皮疹者。尚未见有致过敏性哮喘的报告。本例患者既往无咳嗽病史,服用泰胃美后先出现周身荨麻疹,继之出现哮喘症状,符合泰胃美过敏引起的哮喘发作。其引起哮喘的原因考虑与下列因素有关:组织胺 H₁ 受体(H₁R)有支气管收缩作用,组织胺 H₂ 受体(H₂R)有支气管舒张作用。泰胃美为 H₂R 拮抗剂,当 H₂R 被拮抗时 H₁R 的作用则增强,导致支气管痉挛,哮喘发作。