

卡马西平致重症药疹和上消化道出血 1 例

张桂兰, 汪玉莲(解放军第 546 医院, 马兰 841700)

关键词: 卡马西平; 药疹; 上消化道出血

中图分类号: R971¹. 43

文献标识码: B

文章编号: 1006- 0111(2000)01- 0044- 1A

1 临床资料

患者倪某, 男, 20a, 战士。1997 年 6 月 21 日因左下肢疼痛伴麻木 1wk 收入我院外科, 入院后 po 卡马西平 200mg/d。7 月 7 日下午突然高热, 双眼睑水肿, 流泪, 神志不清 8h, BP170/120mmHg, R24 次/min, 查血 WBC $112 \times 10^9/L$, 分叶 0.92%, 淋巴 0.08%。7 月 8 日耳后、发际、面部及躯干相继出现散在红色斑丘疹, 剧痒, 同时伴有水泡、脓疱, 双眼睑粘膜充血、糜烂, 口腔粘膜大面积糜烂, 张口困难, 并渗出大量臭味粘稠物, 经皮肤科会诊为重症药疹, 立即停用卡马西平, 使用抗过敏药物, 22:00 时主诉剑突下疼痛。吐两口鲜血约 10ml, 并伴有柏油样稀便, 隐血试验阳性, 经内科会诊, 腹部 B 超排除肝硬化出血, 确诊为上消化道出血, 立即使用止血

药, 2d 后病人停止呕血, 7d 后水泡、脓疱干萎、结痂, 最后脱落。

2 讨论

卡马西平为广谱抗癫痫药, 有稳定神经细胞膜电位的作用其不良反应为恶心、呕吐、胃部不适、血小板减少和皮疹等^[1], 但上述两种不良反应同时出现却很少见。国内有个别报道提示, 主要与个体差异有关, 与服药剂量及时间无关。但如果再次服用, 症状将一次比一次加重。因此, 发生过过敏反应的病人出院时, 一定交待清楚, 不能再服此药以避免此类反应的发生。

参考文献:

- [1] 芮耀诚. 现代药理学[M]. 北京: 人民军医出版社, 1999 313~ 314.

收稿日期: 1999- 09- 01

服用维生素 E 致严重黄褐斑 1 例

蒋艳娟(解放军第 191 医院, 贵港 537105)

关键词: 维生素 E; 黄褐斑; 不良反应

中图分类号: R977.2⁵

文献标识码: B

文章编号: 1006- 0111(2000)01- 0044- 1B

1 病例

患者女, 43a, 干部, 近几年来月经不调, 于 1998 年 11 月开始 po 维生素 E 100mg, tid。连服 2mo 时, 颜面颧部出现褐色色素沉着, 但未引起注意, 继续服用维生素 E, 剂量不变。约 3mo 后, 月经不调改善, 但面部色素加深呈黑褐色, 面积扩大累及前额、鼻、口周围及部分颌部而就诊, 诊断为严重黄褐斑, 即停药。经口服中药, 擦去斑霜等治疗, 色素沉着逐渐褪去, 基本恢复

面部正常肤色。

2 讨论

维生素 E 与动物的生育有关, 亦称生育酚, 妇产科用于辅助治疗闭经, 月经不调, 习惯性流产等。本例患者口服维生素 E 后月经不调得到改善, 但可能口服维生素 E 后体内激素发生变化, 而致面部色素沉着, 出现严重黄褐斑。

收稿日期: 1999- 09- 06