

· 药物不良反应与相互作用 ·

香丹注射液致呼吸困难 1 例

谭 静, 谭孝杰, 普英杰, 谢怀龙(中国人民解放军第 533 医院、云南 昆明 650224)

中图分类号: R937.71 文献标识码: D 文章编号: 1006-0111(2003)02-0122-01

香丹注射液是中药丹参和降香的复方制剂。丹参的有效成分有显著的扩张冠脉, 增加冠脉流量, 抗凝血、抗血栓形成, 耐缺氧、改善心肌收缩力、减慢心率、降低血压、血脂等多种作用, 是治疗心血管疾病的常用药物之一。临床应用广泛, 毒性较低, 副作用少见。笔者将使用香丹注射液致呼吸困难 1 例, 现报告如下:

1 临床资料

刘××, 男, 50 岁, 因头昏多日, 平时血压偏高, 于 2002 年 5 月 27 日来我院门诊。查体: 体质偏胖, BP 150/92mmHg, HR 70 次/min, 率齐, $A_2 > P_2$ 、心杂音(-)。心电图: 窦性心率率齐, 左室电压偏高 S-T II、III、AVF、 V_1 下移, $V_1 - V_5$ 均有下移, 初诊为冠状动脉供血不足。即给予香丹注射液 20mL(昆明兴中制药厂生产, 批号为 20011003) 加入 5% GS 250mL 中静滴, 滴入约 50mL 后, 患者渐感胸闷心慌、呼吸急促、口唇轻度紫绀、胸部及前臂皮肤瘙痒, 并出现散在少数充血性皮疹, 立即停止给药, 平卧给氧, 地塞米松注射液 10mg, 10% 葡萄糖酸钙注射液 10mL, 加入 5% GS 20mL 静脉缓慢推注, 12min 后, 呼吸逐渐平稳, 缺氧症状改善, 留院观察 2h, 症状完全消失。次日给予盐酸川芎嗪注射液 80mg(四川蜀

乐药业有限公司生产, 批号为 20010317) 加入 5% GS 250mL 中静滴, 至输完。连用 5d, 无不良反应出现。

2 讨论

本例病人无药物过敏史, 经处理后, 呼吸困难等症随之消失, 改用他药后, 未出现不良反应, 故可确定为香丹注射液所致。其原因可能是: ①丹参的主要化学成分为丹参酮 II A, 云南产的丹参中, 丹参酮 II A 的含量多达 0.5%, 最近的研究表明, 丹参酮 II A 等有效成分具有钙通道阻滞作用。当剂量过大, 滴速过快时, 可反射性使心率加快, 心肌耗氧量增大, 而出现呼吸困难等不良反应^[1,3]。②因个体差异, 极少数人对丹参制剂敏感, 口服、注射均可引发过敏等不良反应。鉴此, 在使用丹参制剂时, 提醒临床仍应注意观察^[2]。

参考文献:

- [1] 官文武. 复方丹参注射液不良反应 91 例分析[J]. 药物不良反应杂志, 2001, 3(3): 156.
- [2] 郑翠英. 复方丹参注射液致严重腹泻、低血压 1 例[J]. 中国医院药学杂志, 2000, 20(3): 188.
- [3] 杨 雁. 静脉滴注复方丹参注射液致不良反应 3 例[J]. 中华名医药, 2002.

收稿日期: 2002-11-12

中国老年学学会骨质疏松委员会 2003 年度两会通知

第九届全国骨质疏松年会(春季会议)定于 2003 年 5 月 18~23 日在成都召开。第四届国际骨质疏松研讨会(秋季会议)定于 11 月 3~8 日在桂林召开, 征文截稿日期 8 月 25 日。

征文内容

有关骨质疏松和骨矿研究的基础、诊断、治疗、预防和中医药方面论文, 两会均设优秀论文奖及学分证书。

热烈欢迎专家学者和同行, 厂家和公司参加。如需了解大会事项, 请来信、来电索取征文通知和参会通知, 也可从网上下载。

联系地址: 北京市朝阳区小营路 9 号亚运豪庭 A 座 05F 室

邮编: 100101 电话: (010)64985881 传真: (010)64936211

联系人: 孙继荣主任 E-mail: 2001@china-osteofound.org

网址(URL): [Http://www.china-osteofound.org](http://www.china-osteofound.org)